

Prefinal 03/12/20

Importante

- Justifica todas tus respuestas.
- Para aprobar se debe obtener al menos 50 puntos.
- En cada hoja que entregues escribí, en forma clara y completa, tu nombre y apellido. Si es posible escribí con birome.
- Al finalizar, toma fotos del prefinal por el celular, y subí las fotos en formato pdf en el apartado "Tu Trabajo - Añadir o crear".
- Una vez subido el archivo, presionar "Entregar". Deben verificar que el documento esté en el sentido correcto y que su calidad permita que sea leído y corregido.

Preguntas

- Las preguntas sobre el enunciado podés hacerlas en "Comentarios privados".
- Preguntas relacionadas con el desarrollo del ejercicio podés hacerlas en "Comentarios privados".

Ejercicios

(1) (a) (15 pts) Dar una base del subespacio vectorial

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 3z = 0, -x - 4z = 0, 3x + 6y + 6z = 0\}.$$

(b) (10 pts) Encontrar un vector no nulo en \mathbb{R}^3 ortogonal a los vectores $(1, 1, 3)$, $(3, 6, 6)$ y $(-1, 0, -4)$.

(2) Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal definida por

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3x_1 + x_3 + 2x_4, 3x_1 - x_2 + x_4, -3x_1 + 2x_2 + x_3).$$

- (a) (10 pts) Encontrar una base de $\text{Im } T$ y dar su dimensión.
 (b) (5 pts) Dar la dimensión del núcleo usando el teorema de la dimensión.
 (c) (10 pts) Extender la base de $\text{Im } T$ a una base de \mathbb{R}^3 .

(3) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal definida por

$$T(x, y, z) = (y - z, x + y - 2z, x - z).$$

Sea $\mathcal{B} = \{(2, 0, 1), (1, -2, 1), (1, 1, 1)\}$ base de \mathbb{R}^3 y \mathcal{C} la base canónica de \mathbb{R}^3 .

- (a) (15 pts) Calcular la matriz de cambio de base de \mathcal{B} a \mathcal{C} , es decir $[\text{Id}]_{\mathcal{BC}}$ y la matriz de cambio de base de \mathcal{C} a \mathcal{B} , es decir $[\text{Id}]_{\mathcal{CB}}$.
- (b) (10 pts) Calcular la matriz de T en la base \mathcal{B} , es decir $[T]_{\mathcal{BB}}$.

- (4) (a) (15 pts) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal asociada a la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Es decir $T(v) = Av$. Probar que T es diagonalizable.

- (b) (5 pts) Sean V y W dos subespacios vectoriales del espacio vectorial $\mathbb{K}_{12}[X]$ formado por todos los polinomios de grado estrictamente menor que 12. Probar que si $\dim V = \dim W = 7$ entonces $V \cap W \neq \{0\}$.
- (c) (5 pts) Mostrar que existe una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\{(0, 1, 1), (0, 1, 0)\}$ es una base de $\text{Nu } T$ y $\{(1, 1, 1)\}$ es una base de $\text{Im } T$.