



PINKBOMBS

Tableau des choix alimentaires Méthodologie détaillée

Salut à toi !

Si tu lis ces mots cela signifie que tu as décidé de creuser le sujet et de découvrir plus en détails notre passionnant tableau des choix alimentaires, alors pour ce premier pas, on te dit MERCI !

Curiosité, questionnement, ouverture d'esprit et appui sur la science pour s'éduquer sont les maîtres mots pour faciliter la prise de recul et le changement de nos perceptions et habitudes alimentaires. Bonne lecture !




Figure 1: Le tableau des choix alimentaires (version simplifiée), tel que disponible sur le site pinkbombs.org

INTRODUCTION

Nous avons construit deux tableaux, une version simplifiée (Annexe A) et une version détaillée (Annexe B).

Pour comparer les alternatives à la consommation de saumon, nous avons sélectionné les choix alimentaires suivants (version détaillée, voir Annexe B) :

- le saumon
- les autres poissons : thon, truite, sardine et maquereau
- les produits de la mer issus de l'aquaculture de faible niveau trophique: coquillages, algues
- le simili saumon fumé
- les huiles végétales
- les compléments alimentaires

Nous avons analysé ces choix alimentaires à travers une grille d'analyse d'impacts en termes de santé, d'écologie et d'éthique englobant les impacts sociaux et de condition animale.

La version détaillée intègre des éléments d'analyse supplémentaires à savoir :

- une désagrégation par sexe des apports journaliers en oméga 3
- l'impact financier des choix alimentaires en vue d'avoir les apports journalier en oméga 3
- cinq choix alimentaires supplémentaires à savoir : le saumon bio, la truite d'élevage, l'huile de lin, les compléments alimentaires en oméga 3 d'origine végétale et d'origine animale

Glossaire

- Choix alimentaires : nous utilisons l'expression de choix alimentaires car dans ce tableau se trouvent des animaux (thons, saumons, huîtres...). De fait, ce sont d'abord des êtres vivants doués de sensibilité, qui prennent le statut d'aliment à la suite d'un choix, individuel ou de société. Qu'il s'agisse d'algues, de moules ou de sardines, ces espèces, animales ou végétales, existent indépendamment de l'utilisation que nous décidons d'en faire. Les décrire comme des aliments ou des produits revient à ne considérer leur existence que par le prisme de l'utilisation principale qu'en font les êtres humains.

Plan de la notice

1. Lecture de l'échelle colorimétrique des impacts
2. Critères de sélection des choix alimentaires
3. Critères de sélection des impacts: santé, environnement, impacts sociaux et condition animale
4. Résultats et discussion : famille des oméga 3, compléments alimentaires en oméga 3, coût financier

Annexe A - Le tableau des choix alimentaires, version simplifiée avec la description de chaque élément

Annexe B - Le tableau des choix alimentaires (version détaillée)

1. Lecture de l'échelle colorimétrique des impacts

L'objectif est de définir le degré d'impact en partant du postulat que notre consommation a forcément un impact à différents niveaux (santé, justice sociale, condition animale, climat, etc).

Le degré de ces impacts varie selon les choix alimentaires, le mode de production, la rémunération des producteurs·ices et les conditions de travail.

- Excessivement fort - Rouge foncé
- Très fort - Rouge
- Fort - Orange
- Modéré - Jaune
- Réduit - Vert clair
- Très réduit - Vert foncé

2. Critères de sélection des choix alimentaires

Choix alimentaires d'origine marine

La comparaison a été faite selon le mode de consommation le plus courant (frais, fumé, en boîte) déterminé selon les [données de consommation de France Agrimer de 2020](#).

- Saumon fumé : 2ème poisson le plus consommé en France; comparaison de la production en bio et en conventionnel ; comparaison de la production en cages marines versus en cages terrestres (RAS). Le mode de consommation "fumé" a été retenu afin de permettre une comparaison objective entre la truite fumée et le simili saumon fumé.
- Truite fumée : 2ème poisson fumé le plus consommé après le saumon en France
- Thon en boîte : poisson le plus consommé en France
- Sardines, maquereaux en boîte : poissons en bas de la chaîne trophique (synonyme direct de chaîne alimentaire) par rapport aux saumons, aux thons et aux truites
- Coquillages & algues : produits de la mer provenant d'une aquaculture durable de faible niveau trophique et présentant des [bénéfices écosystémiques entre algues et bivalves](#)

Situation des différents poissons d'après le rapport Agrimer :

Saumon : 98% élevage ; saumon frais : 30 962 tonnes ; saumon fumé : 16 697 tonnes ; page 112

Thon : 100% issu de la pêche ; thon en boîte : 70 350 tonnes ; thon frais : 2 334 tonnes ; page 119

Truite : 100% élevage ; truite fumée : 6369 tonnes ; truite fraîche : 6053 tonnes ; page 124

Sardine : sardines en boîte : 18173 tonnes ; sardines fraîches : 3249 tonnes ; page 109

Maquereau : maquereaux en boîte : 6053 tonnes ; maquereaux frais : 4 195 tonnes ; page 92

Coquillages les plus consommés : moules : 36510 tonnes ; huîtres : 26 925 tonnes ; page 38

Choix alimentaires d'origine végétale

Les produits alimentaires ont été sélectionnés selon leurs apports nutritionnels en oméga 3 et la capacité à pouvoir se positionner comme une alternative en termes de goût à certaines options d'origine marine (notamment le saumon fumé). Ces choix alimentaires ont été comparés selon le mode de consommation le plus courant, l'accessibilité et le prix.

- Huile de lin : 1er aliment qui contient le plus d'oméga 3, vendu en grande surface depuis quelques années
- Huile de colza : 2ème aliment qui contient le plus d'oméga 3, vendu en grande surface depuis des dizaines d'années, produit connu et plus accessible en termes de prix
- Simili saumon fumé : produit identifié comme une alternative végétale au saumon fumé en termes de goût et d'apports nutritionnels. Nous avons sélectionné un simili-saumon élaboré en France, en Gironde, et riche en oméga 3. Tous les simili saumon fumé n'apportent pas la même quantité d'oméga 3, ce n'est pas une obligation.

Compléments alimentaires en oméga 3

Comparaison entre les compléments alimentaires en oméga 3 d'origine végétale et ceux d'origine animale et marine, la variable prix a été introduite dans la comparaison afin de vérifier l'impact financier sur le panier alimentaire. Le complément alimentaire d'origine animale marine est celui que l'on trouve le plus facilement en grande surface comme en parapharmacie. Afin de respecter cette réalité, un produit vendu chez Carrefour, estampillé marque distributeur, a été sélectionné. Le complément alimentaire d'origine végétale est rarement accessible dans les lieux d'achats conventionnels, son achat se fait souvent en ligne, il s'agit donc d'un produit vendu en ligne.

3. Critères de sélection des impacts

Notre grille d'analyse des impacts a été définie selon l'approche de la santé planétaire. Il s'agit d'une approche de santé globale qui relie et permet de comprendre les interconnexions entre les humains, les animaux et les écosystèmes marins et terrestres au sein desquels nous vivons. La santé planétaire fait le constat que la santé humaine dépend de la bonne santé des animaux et de l'environnement. Ainsi nous avons retenu les impacts sur la santé humaine, l'environnement, l'équité alimentaire et le bien-être des animaux.

SANTÉ

Nous avons décliné l'analyse des impacts sur la santé en termes de risques de contamination à des éléments toxiques et de bénéfiques nutritionnels centrés précisément sur l'apport en oméga 3. En effet, pour les poissons gras, l'apport en oméga 3 est l'intérêt nutritionnel mis en avant.

Éléments toxiques

Pour comprendre le type et le degré de contamination, nous avons utilisé les travaux des [institutions de santé publique françaises](#), avec une [spécificité pour le saumon](#) et [européennes](#) et pour certains points tels que les microplastiques, le travail de laboratoire scientifique basé à l'étranger (voir rapport ["Saumons : une bombe rose d'un système à bout de souffle"](#)). Nous avons pris en compte les microplastiques et les polluants organiques persistants (abrégés en POP) qui sont des composés persistants, bioaccumulables, toxiques et mobiles. Les POP rassemblent les éléments toxiques suivants : les métaux lourds (mercure, plomb, cadmium etc.), les dioxines, les [polychlorobiphényles \(PCB\)](#) et les [per- et polyfluoroalkylées \(PFAS\)](#) plus connus sous le nom de "polluants éternels".

Les niveaux et types de contamination varient d'un aliment à un autre. Dès lors qu'un aliment a présenté un degré élevé de contamination à l'un des éléments toxiques identifiés, nous avons attribué un critère d'impact modéré/fort/très fort. Par exemple, le mercure est très présent dans le [thon](#) mais très peu dans le saumon qui contient plus fortement des microplastiques et des PFAS. [Les poissons gras \(saumons, sardines, maquereaux, page 72, 74 du rapport CALIPSO\)](#) et coquillages sont parmi les espèces les plus contaminées aux polluants. Concernant les algues, le [risque de contamination](#) varie selon la qualité de l'eau.

Limites : concernant les PFAS et les microplastiques, nous sommes aux prémises de la recherche scientifique qui a besoin de poursuivre son travail pour mesurer l'ampleur de ces problématiques. Ainsi, la communauté scientifique a établi avec certitude que les poissons gras tel que le saumon sont les plus sujets à une contamination au PFAS, en revanche, il n'existe pas encore d'étude qui a testé et vérifié l'ampleur de cette contamination.

Oméga 3

La consommation de poissons gras étant communément recommandée pour avoir un apport en oméga 3, nous avons cherché à savoir si le saumon est la seule source intéressante d'apports en oméga 3 et s'il s'agit d'une source véritablement bénéfique pour la santé humaine. Nous avons analysé les bénéfices nutritionnels en oméga 3 et les risques en termes de polluants des différents choix alimentaires.

L'information la plus importante à retenir est que malgré la consommation croissante de poissons, [la population française est en insuffisance d'oméga 3](#). La section "Résultat & Discussion" est dédiée à la compréhension de ce paradoxe et des enjeux autour des oméga 3.

La matrice simplifiée présente les apports en oméga 3 des femmes.

La matrice détaillée présente les apports journaliers en oméga 3 désagrégés par sexe.

Nous avons calculé :

- l'apport journalier en oméga 3 pour 100g d'aliment, calcul effectué à partir des [données de la table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2020 de l'ANSES](#) à savoir: [saumon fumé](#) 26097 ; [truite](#) 26123 ; [thon](#) 26181 ; [maquereau](#) 26123 ; [sardine](#) 26034 ; [moule](#) 10013 ; [huîtres](#) 10111, [simili saumon fumé](#) ; [huile de lin](#) 17180 ; [huile de colza](#) 17130 ;
- le rapport entre l'apport journalier en oméga 3 pour 100g d'aliment et l'apport nutritionnel journalier recommandé par l'ANSES en oméga 3 (ALA, DHA, EPA) pour les 18 à 59 ans soit pour [les femmes 2,3 g et pour les hommes 3 g](#).

Exemple du calcul pour le saumon fumé :

Apports pour 100 g de saumon fumé : 1,67g

Couverture journalière en oméga 3, en pourcentage pour 100g de produit - Femme

$1,67 \times 100 / 2,3 = 72,60\%$

Couverture journalière en oméga 3, en pourcentage pour 100g de produit - Homme

$1,67 \times 100 / 3 = 55,60\%$

Le même calcul a été effectué pour les autres aliments en utilisant la même base de données.

ENVIRONNEMENT

Biodiversité

Nous avons mené une analyse qualitative et quantitative des impacts sur les écosystèmes aquatiques et terrestres (eutrophisation, épuisement des ressources, écotoxicité pour les écosystèmes aquatiques d'eau douce, acidification terrestre et eau douce, épuisement des ressources énergétiques, eau et minéraux), ainsi que sur les espèces animales sauvages et d'élevages. Pour le volet quantitatif, nous avons opté pour l'utilisation des données d'Agribalyse (ADEME) concernant l'impact du cycle de vie pour la catégorie "agriculture".

[Saumon fumé](#), [truite](#), [thon](#), [sardine](#) et [maquereau](#) (une moyenne a été faite), coquillages : [moules](#) & [huîtres](#) (une moyenne a été faite), [algues](#), [huile de lin](#), [huile de colza](#).

Simili saumon fumé : ce produit n'est pas encore référencé sur Agribalyse, en revanche la [spécialité végétale jambon cuit](#) est référencée et tant sa composition que méthode de fabrication se rapprochent fortement de celle du simili saumon fumé.

Empreinte carbone (CO2)

Nous avons utilisé les données d'Agribalyse (ADEME), à une exception.

Le saumon d'élevage terrestre n'est pas référencé sur la plateforme Agribalyse. Par conséquent, nous mettons un intervalle sur la base de données du rapport "[Saumons : une bombe rose d'un système à bout de souffle](#)" (page 18 et 42).

Limites :

- Concernant le saumon d'élevage en cages marines (fumé), il est important de souligner que [l'indicateur d'Agribalyse](#), qui estime son empreinte à 7,99 kg CO2eq/kg produit, ne permet pas de différencier l'empreinte carbone du saumon d'élevage conventionnel de la production de saumons en bio. En effet, le saumon bio consomme plus de poissons pélagiques (le cahier des charges exigeant une alimentation à 51% d'origine marine), par conséquent l'indicateur d'Agribalyse ne semble pas représentatif de l'empreinte plus élevée du saumon bio.
- Concernant le simili saumon fumé, son empreinte carbone n'a pas encore été calculé par Agribalyse (à venir), la composition de ce simili se rapproche de celle du jambon végétal nous avons donc fait le choix de mettre l'empreinte de ce produit.

Sources par choix alimentaires : [saumon fumé](#), [thon en boîte](#), [truite](#), [sardines en boîte](#), [maquereau en boîte](#), coquillages (moyenne entre [moules](#), [huîtres](#)), algues (moyenne entre [nori](#), [kombu breton](#), [haricot de mer](#)), [huile de lin](#), [huile de colza](#), [simili saumon fumé](#).

IMPACTS SOCIAUX

Détournement des ressources et gaspillage alimentaire

Nous avons mené une analyse qualitative pour mesurer les impacts sur :

- [les systèmes alimentaires](#) à travers
 - le [détournement de ressources](#) et le gaspillage alimentaire
 - une approche d'équité alimentaire
- l'emploi : création et destruction d'emploi à l'étranger et en France
- le respect des droits humains : droit du travail, droit à l'alimentation, risque de traite humaine

Sources : [saumon d'élevage terrestre](#), [saumon d'élevage en mer](#), [saumon bio](#), truite, [sardines/maquereau](#), [thon](#), secteur [conchylicole](#) : [moules et huîtres](#), [algues](#), [filère lin](#), [filère colza](#), [compléments alimentaires](#) à base d'[huile de poissons](#),

CONDITION ANIMALE

Nous avons mené une analyse qualitative et quantitative pour mesurer les impacts sur les conditions de vie des poissons (saumons, truites, thons, sardines, maquereaux). Nous avons sélectionné trois variables.

Densité

Nous avons mesuré l'espace de vie accordé aux poissons qui grandissent en captivité dans des élevages intensifs en mer ou sur terre afin de déterminer le degré d'impact sur leurs besoins et bien-être.

Sources par espèces : [saumon d'élevage terrestre](#) (rapport "Appel pour un moratoire contre les fermes-usines en France) , [saumon d'élevage en mer](#) (rapport "[Saumons : une bombe rose d'un système à bout de souffle](#)"), [saumon bio](#).

Maladies & stress

Nous avons mené une analyse qualitative sur la santé des poissons à travers : le type de maladies et leurs conséquences sur l'état de santé des poissons, les traitements proposés et leurs résultats sur les poissons malades ainsi que sur les autres animaux aquatiques vivant autour des cages marines. Certaines données qualitatives sont internes et issues de sources confidentielles.

Sources par espèces : [saumon d'élevage terrestre](#) (rapport "Appel pour un moratoire contre les fermes-usines en France) , [saumon d'élevage en mer](#) (rapport "[Saumons : une bombe rose d'un système à bout de souffle](#)"), [saumon bio](#).

Pratiques d'élevage et de pêche

Nous avons mené une analyse qualitative sur les techniques d'élevage, de pêche, les impacts sur les poissons pêchés et les espèces non ciblées.

Sources par espèces : [saumon d'élevage terrestre](#) (rapport "Appel pour un moratoire contre les fermes-usines en France) , [saumon d'élevage en mer](#), [saumon bio](#), [thon 1](#), [thon 2](#), [sardines et maquereaux](#) , [compléments alimentaires à base d'huile de poisson](#) et de [krill](#)

4. RÉSULTATS & DISCUSSION

La famille des oméga 3

- L'acide alpha-linolénique (ALA) : c'est l'unique forme présente dans les végétaux, donc l'unique forme apportée par une alimentation exclusivement végétale. C'est le précurseur à partir duquel l'organisme synthétise d'autres acides gras oméga 3 lorsqu'ils ne sont pas apportés par l'alimentation, notamment :
- L'acide eicosapentaénoïque (EPA)
- L'acide docosahexaénoïque (DHA)

Il est également possible d'avoir un apport exogène de DHA et EPA en consommant des aliments carnés (poissons oeufs).

Enjeux : L'ALA est l'unique forme d'oméga 3 présente dans les végétaux, et moins de 1 % de l'ALA consommé sera converti en DHA. On peut alors se demander s'il est nécessaire de se compléter en DHA ?

Source : *Observatoire National de l'Alimentation Végétale (ONAV)*, [Faut-il se compléter en DHA lorsqu'on végétalise son alimentation ?](#) Note scientifique, octobre 2023

Intérêts nutritionnels et apport nutritionnel recommandé (ANC)

Les oméga 3 sont considérés comme des nutriments dits "essentiels" car ils ne peuvent pas être produits par notre corps. Ils permettent le développement et le bon fonctionnement de la rétine, du cerveau, du système nerveux et du système cardio-vasculaire. Les oméga 3 présentent un intérêt pour [la cognition, la mémoire ou la vision](#) pour les femmes allaitantes, enceinte et les enfants de moins de six mois.

Apport nutritionnel journalier recommandé par l'ANSES en **oméga 3** (ALA, DHA, EPA) pour les 18 à 59 ans

- pour les femmes : 2,3 g
- pour les hommes : 3 g

Source : <https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2006sa0359.pdf>
<https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2014sa0117Ra.pdf>

Apport nutritionnel journalier recommandé par l'ANSES en **DHA/EPA** pour les 18 à 59 ans

- en DHA : 250 mg
- en DHA/EPA : 500 mg

Source : <https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2006sa0359.pdf>
<https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2014sa0117Ra.pdf>

Bilan nutritionnel

La population française est en insuffisance d'oméga 3 et consomme beaucoup trop d'oméga 6.

- 99 % des adultes ont un apport journalier insuffisant en ALA
- 89 % des adultes ont un apport journalier cumulé en EPA et DHA insuffisant malgré une consommation croissante de poisson

Pourquoi et comment expliquer un tel paradoxe ?

L'ANSES recommande un ratio entre **oméga 6 et oméga 3** de **5** maximum, soit maximum 5 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3.

- Actuellement, le ratio entre oméga 6 et oméga 3 est de **10**
- les oméga 6 sont pro-inflammatoires, vasoconstricteurs et favorisent les maladies cardiovasculaires
- les oméga 6 se trouve dans les aliments carnés (poissons, viandes, oeufs, produits laitiers) et les aliments transformés

ANSES, *Apports en acides gras de la population vivant en France et comparaison aux apports nutritionnels conseillés définis en 2010*, Avis de l'Anses - Rapport d'étude, 2015, page 172 et 199 page
<https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2014sa0117Ra.pdf>
<https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT-Ra-omega3.pdf> page 27
<https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2014sa0117Ra.pdf> page 23-25

Limites et avancées scientifiques récentes sur l'intérêt de se supplémenter et consommer des DHA

- A l'échelle mondiale, il manque des études sur des personnes ayant un régime végétalien et végétarien
- Pas de bénéfices avérés pour lutter contre les maladies cardiovasculaires selon la dernière méta analyse américaine de 2020, [Effect of High-Dose Omega-3 Fatty Acids vs Corn Oil on Major Adverse Cardiovascular Events in Patients at High Cardiovascular Risk](#)
- Des bénéfices pour préserver le vieillissement du cerveau pour les personnes âgées (voir bibliographie à la fin)
- Pas de bénéfices avérés pour les femmes enceintes / enfants sur la cognition, la mémoire ou la vision des bébés. A large dose, cela peut avoir des effets négatifs. (voir bibliographie à la fin)

Les meilleures sources végétales d'oméga 3

L'infographie présentée ci-dessous a été élaborée par "[Je mange végétal](#)" et présente les meilleures sources végétales d'oméga 3. Le poster est [téléchargeable ici](#).

A savoir : l'huile de lin et de colza ont un excellent rapport oméga-3/oméga-6 et sont donc à privilégier.

Légumes, céréales, légumineuses et fruits crus



Tofu



Chou frisé



Kiwi



Épinard



Cresson alénois

Légumes, céréales, légumineuses, fruits et champignons cuits



Tofu



Flageolet



Haricot blanc



Protéine de soja texturée



Chou-fleur



Brocoli

Oléagineux, farines, huiles, graines, fruits à coque et eaux



Huile de lin



Graine de lin



Graine de chia



Huile de noix



Graine de
chanvre



Huile de colza



Noix



Huile de soja



Huile de germe
de blé

Se supplémenter en oméga 3

Se supplémenter en oméga 3 peut parfois être nécessaire, voici les informations à avoir en tête.

Pour avoir les oméga 3 correspondants à l'ANC journalier, il est possible:

- de consommer des aliments riches en ALA (huile de colza, huile de lin, graine de lin/de chia, noix etc.)
- de se supplémenter en DHA/EPA d'origine
 - végétale élaboré à partir d'algue (Schizochytrium), sain et sans risque de contamination à des métaux lourds, PCB, PFAS et microplastiques
 - animale élaboré avec du krill et de l'huile de poissons, présentant un risque accru de contamination à des métaux lourds, PCB et PFAS

Compléments alimentaires à base d'huile de poissons

Les poissons obtiennent leurs apports en DHA/EPA en consommant des algues. Les poissons et le [krill](#) sont pêchés pour être transformés en huile de poissons mise sous gélule afin de fournir un apport en DHA/EPA à la population humaine.

Les compléments alimentaires d'origine marine constituent un marché très lucratif et sont sources d'impacts forts sur les écosystèmes marins. En effet, ce marché participe à la surpêche et à la [pêche au krill](#). L'intérêt de ces compléments est sujet à de nombreuses controverses, très souvent ils sont chargés en PCB provenant de l'huile de poissons ou du processus de fabrication (purification). En l'absence d'un cahier des charges - un complément n'est pas un médicament - le choix de la qualité et de la vérification des bénéfices est laissé à l'industriel.

Compléments alimentaires végétal à base d'algues - Schizochytrium

Ce complément alimentaire est élaboré à partir d'une micro algue dont la production est faible en impacts, saine pour la santé humaine car sans risque de contamination à des métaux lourds, PCB, PFAS et microplastiques.

Pour le moment, le développement de la filière est orienté en vue de compléter les animaux d'élevage consommés par les humains. L'industrie agroalimentaire cherche à enrichir l'alimentation des vaches, cochons et saumons en oméga 3 d'origine végétale (respectivement graines de lins, algue Schizochytrium pour remplacer l'huile de poissons qui coûte cher et dont l'impact carbone est élevé).

Cette approche présente des limites :

- Même enrichie en oméga 3, une alimentation très majoritairement carnée (viande, poissons, oeufs, produits laitiers) ne résout pas le problème de surconsommation d'oméga 6 très présents dans ces choix alimentaires.
- Elle contribue indirectement à soutenir les élevages intensifs sources importantes d'émissions de gaz à effet de serre (GES).
- Elle ignore le gaspillage alimentaire et la perte d'énergie de l'ajout d'un intermédiaire supplémentaire (un animal) entre la source végétale et l'humain. Cette perte s'explique par la loi des 10% de Lindeman du transfert d'énergie dans les écosystèmes : à chaque niveau trophique une perte énergétique (en calories) de 90% est constatée, laissant uniquement 10% d'énergie disponible (en calories) [Eléments d'écologie : Ecologie fondamentale - 4e édition. Chapitre 5 - Flux de l'énergie et cycle de la matière dans les écosystèmes](#).

Coût financier

Nous avons sélectionné et comparé les choix alimentaires suivants :

- les poissons contenant le plus d'oméga 3: les saumons et les sardines
- les compléments alimentaires d'origine animale à base d'huile de poissons et de krill
- les compléments alimentaires d'origine végétale à base de microalgue Schizochytrium
- l'aliment végétal contenant le plus d'oméga 3 : l'huile de lin

	Saumon frais (pavé de 110g)	Sardines (boîte de 100g)	Compléments alimentaires en huile de poissons (120 capsules, 2/jour)	Compléments alimentaire d'origine végétale (60 capsules, 1/jour)	Huile de lin (une cuillère à café/jour 5g)
Coût pour 31 jours	82.15€	55.49€	17.8€	13.3€	2.66 €

Coût unitaire	5,30€	1,79€	23€	25.9€	4.29€
Coût par jour	2,65€ *	1,79€**	0,575ct€	0.43 ct€	0.08ct€

Saumon, pavé de 110g/jour, consulté le 04/04/2023 :

<https://www.carrefour.fr/p/paves-de-saumon-avec-peau-s-arete-simpl-3523680491977>


* Même en consommant quotidiennement un pavé de saumon, les apports journaliers nécessaires en oméga 3 DHA/EPA ne sont pas atteints. En effet, pour les femmes, cela représente un apport de 98.5% et de 75% pour les hommes.

Prix unitaire 5.30€

Calcul pour 1 mois/31 jours : $5.30 \times 15,5 = 82.15€$

Calcul journalier : $5.30/2 = 2.65€$

NB: Le saumon sélectionné étant le plus communément vendu en barquette de deux pavés de 110g, et le calcul se basant sur un pavé par jour, le prix unitaire est divisé par deux.



Pavés de saumon avec peau s/arête SIMPL
la barquette de 2 - 220g

24.05 €/KG

Origine
NORVÈGE

[Voir tous les produits du rayon >](#)

Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé ⓘ

Drive ou Livraison

5,29€

Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.

[Choisir mon service](#)

Sardine en boîte de 100g, consulté le 31/05/2024


<https://www.carrefour.fr/s?q=sardine>

** les sardines sont communément vendues en boîte de 80 à 100g nets, égouttées. Même en consommant quotidiennement une boîte de sardines, les apports journaliers nécessaires en oméga 3 DHA/EPA ne sont pas atteints. En effet, pour les femmes, cela représente un apport de 80,5% et de 61,6% pour les hommes.

Prix unitaire 1.79€

Calcul pour 1 mois/31 jours : $1.79 \times 31 = 55.49€$

Calcul journalier : 1.79€



Filets de sardines huile d'olive s/arêtes SAUPIQUET
la boîte de 100 g

17.90 € / KG

Description Voir plus

Les filets de sardines Saupiquet sont sans arêtes, tendres et savoureux. Agrémentée d'huile d'olive vierge extra, cette recette viendra ravir votre palais !

Ingrédients (dont ALLERGÈNES) Voir plus

Filets de SARDINES**, huile d'olive vierge extra, olives (6%), sel. **Sardina pilchardus

Drive ou Livraison

1,79€

Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.


Choisir mon service

Compléments alimentaires en DHA/EPA à base d'huile de poissons, consulté le 04/04/2023 : <https://www.carrefour.fr/p/omega-3-huile-de-poissons-sauvages-2000mg-omega-3-issus-de-peche-durable-120-gelules-anti-oxydation-377001276411>

Prix unitaire 23€ pour 40 jours (2 gélules/jour)

Calcul journalier : $23/40 = 0.575$ ct€

Calcul pour 1 mois/31 jours : $0.575 * 31 = 17.8€$



Omega 3 Huile De Poissons Sauvages 2000mg, Oméga-3 Issus De Pêche Durable, 120 Gélules Anti Oxydation, Nutri&co
les 120 unités

Description Voir plus

- **HAUTE CONCENTRATION & ABSORPTION** •
Une formule composée d'huiles de poissons sauvages hautement concentrées sous forme naturelle de triglycéride. 3 gélules de taille standard apportent 1500mg d'huile de poissons et 1050mg d'oméga-3 dont 750mg de dHA et 150mg d'EPA.
- **SANS ODEUR** •
Nos huiles d'oméga-3 sont 100% désodorisées pour vous éviter ainsi les relents et...

Ingrédients (dont ALLERGÈNES) Voir plus

Ingrédients : Huile de poissons sauvages (anchois, sardines, maquereaux)

Vendu et livré par **NUTRI & CO**

22,90€

Meilleure offre partenaires

Livraison 5€ sous 5 à 7 jours ouvrés

Ajouter au panier

L'assistant intelligent

Compléments alimentaires en DHA/EPA d'origine végétale pour 2 mois (60 jours), consulté le 04/04/2023 :

<https://www.officialveganshop.com/dha-omega-3-vegan-essentiels-argalys-8456.html>

Prix unitaire 25.9€ pour 2 mois

Calcul pour 1 mois/31 jours : $25.9/2 = 13.3€$

Calcul journalier : $13.3/31 = 0.429$ ct€



aRgalys ARGALYS

DHA Omega 3 - Vegan Essentiels - 60 capsules

25,90 €

✓ En stock



AJOUTER AU PANIER



DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉTAILS DU PRODUIT

AVIS : 4.9/5 POUR 21 AVIS

Le DHA Oméga 3 Argalys Vegan Essentiels est un complément alimentaire certifié vegan ! Il est formulé à base de microalgue Schizochytrium Sp.

La dose de 250mg par gélule de DHA contribue au bon fonctionnement du cerveau, de la vision et du système cardio-vasculaire. L'indice d'oxydation est particulièrement faible pour chaque gélule. Contrairement aux capsules standard, ici les omégas 3 préservent tous leurs bienfaits. De plus, le DHA oméga 3 d'Argalys n'a pas d'impact négatif sur la faune marine !

Huile de lin, bouteille de 250ml, consulté le 04/04/2023 :

<https://www.carrefour.fr/p/huile-bio-de-lin-carrefour-bio-3560071402556>

Apports pour 100g d'huile de lin = 53,3g d'ALA (pas de DHA/EPA)

Couverture journalière en oméga 3, en pourcentage pour 100g de produit - Femme = 2317%

Couverture journalière en oméga 3, en pourcentage pour 100g de produit - Homme = 1777%

Apport nécessaire pour avoir 100% des apports journaliers (ANC)

- Femme : $100 \times 100 / 2317 = 4,31$ g

- Homme : $100 \times 100 / 1777 = 5,6$ g

En moyenne, il faut environ une cuillère à café soit 5 g d'huile de lin pour avoir les apports journaliers. Une bouteille d'huile de lin en commerce est généralement commercialisée au format de 250 ml soit 250 g ce qui permet une consommation sur 50 jours ($5 \times 50 = 250$).

Prix unitaire 4.29€ pour 50 jours

Calcul pour 1 mois/31 jours : $0.086 \times 31 = 2.66$ €

Calcul journalier : $4.29 / 50 = 0.08$



Huile bio de lin CARREFOUR BIO

la bouteille de 25cl

17.16 € / L
★★★★☆ (631)

Ingrédients (dont ALLERGÈNES) [Voir plus](#)

100% huile vierge de lin biologique
Peut contenir des traces de FRUITS A COQUE et de graines de SESAME

Valeurs nutritionnelles [Voir plus](#)

	Valeurs nutritionnelles pour 100 ml
Valeur énergétique (kJ)	3404 kJ / 100 ml

 Drive ou Livraison

4,29€

 10% d'économies

Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.

[Choisir mon service](#)



Annexe A - Le tableau des choix alimentaires, version simplifiée avec la description de chaque élément

	Description des critères	Saumon (élevage terrestre)	Saumon (élevage en mer)	Thon albacore pêché	Sardines, maquereaux	Coquillages (moules, huîtres)	Algues	Simili saumon fumé	Huile de colza (bio)
Éléments toxiques	Impacts sur la santé humaine. Niveau de contamination aux polluants éternels (PCB, PFAS), métaux lourds et microplastiques.	5 - Contamination aux PCB, PFAS et microplastiques. Principal mode d'imprégnation : les poissons gras et les crustacés.	5 - Contamination aux PCB, PFAS et microplastiques. Principal mode d'imprégnation : les poissons gras et les crustacés.	6 - Le thon est le poisson présentant le plus fort taux de contamination au mercure.	5 - Les poissons gras sont parmi les espèces les plus contaminées aux polluants.	4 - Les coquillages sont parmi les espèces les plus contaminées aux polluants.	2 - La contamination des algues varie selon la qualité de l'eau.	1 - Le simili saumon fumé ne contient pas d'éléments toxiques (PCB, PFAS, microplastiques).	1 - L'huile de colza bio ne contient pas d'éléments toxiques (PCB, PFAS, microplastiques).
Apport en oméga 3	Impacts sur la santé nutritionnelle. Paradoxe, la population française est en insuffisance d'oméga 3 malgré la hausse de la consommation de poissons. Découvrez pourquoi dans la méthodologie.	2 - Consommer quotidiennement 100g de saumon fumé couvre 73% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA ↗ .	2 - Consommer quotidiennement 100g de saumon fumé couvre 73% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA ↗ .	5 - Consommer quotidiennement 100g de thon albacore couvre 29% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA ↗ .	1 - Consommer quotidiennement 100g de sardines/maquereaux couvre 93% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA ↗ .	5 - Consommer quotidiennement 100g de coquillages couvre 17% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA ↗ .	6 - Les algues ne contiennent pas d'oméga 3.	2 - Consommer quotidiennement 100g de simili couvre 74% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA ↗ .	1 - Consommer quotidiennement 100g d'huile de colza couvre 328% des besoins journaliers en oméga 3. Pour atteindre les 100% d'apports journaliers pour 100g, 2 à 3 cuillères à soupe par jour suffisent. Oméga 3 de type ALA ↗ .
Biodiversité	Impacts sur les écosystèmes aquatiques et terrestres & sur les espèces animales sauvages et d'élevage.	5 - Fortes pressions environnementales liées à l'alimentation des saumons : l'approvisionnement en farines végétales contribue à la déforestation en Amazonie ; les farines de poissons aggravent la surpêche et le déclin des populations de poissons sauvages.	6 - Forte pressions environnementales liées à l'alimentation des saumons et dégradation forte de la qualité de l'eau du milieu marin : rejets de nutriments et d'excréments, eutrophisation et bloom de phytoplancton, rejets de pesticides et microplastiques.	6 - Les techniques utilisées par les pêcheries de thons impactent de nombreuses espèces non ciblées (100.000 tonnes de captures accessoires et rejets chaque année dans les pêcheries mondiales de thon).	4 - Acidification terrestre et eaux douces, épuisement des ressources énergétiques et eau, écotoxicité pour écosystèmes aquatiques d'eau douce.	4 - Épuisement des ressources énergétiques.	5 - Acidification terrestre et eaux douces, épuisement des ressources minérales.	2 - Impact faible sur les écosystèmes terrestres, aquatiques et sur la faune sauvage.	1 - La production en bio ne présente quasiment aucun impact.
Empreinte carbone	Émissions de gaz à effet de serre (GES).	6 - L'empreinte carbone du saumon (élevage terrestre) est estimée entre 2 et 14kg de CO2 équivalent par kg de saumon produit.	5 - L'empreinte carbone du saumon (élevage en mer) est estimée entre 7 et 10kg de CO2 équivalent de saumon produit.	3 - L'empreinte carbone du thon albacore est estimée à 4,4kg de CO2 équivalent par kg de thon produit.	4 - L'empreinte carbone des sardines/maquereaux est estimée à 7,28kg de CO2 équivalent par kg produit.	4 - L'empreinte carbone des coquillages est estimée à 5,7kg de CO2 équivalent par kg produit.	4 - L'empreinte carbone des algues est estimée à 6,7kg de CO2 équivalent par kg produit (moyenne de ulva, nori, kombu breton, haricot de mer).	1 - L'empreinte carbone du simili est estimée à 1,6kg de CO2 équivalent par kg produit.	2 - L'empreinte carbone de l'huile de colza est estimée à 2,3kg de CO2 équivalent par kg produit.
Impacts sociaux	Impacts sur les droits humains, sur l'équité d'accès à l'alimentation, et sur l'emploi.	6 - Fort détournement des productions de soja et de la pêche des petits pélagiques pour nourrir les saumons au détriment des peuples humains ; 90% des captures de la pêche minière mondiale sont composées d'espèces directement comestibles par les humains.	6 - Fort détournement des productions de soja et de la pêche des petits poissons pélagiques pour nourrir les saumons d'élevage au détriment des peuples humains ; 90% des captures de la pêche minière mondiale sont composées d'espèces directement comestibles par les humains.	6 - L'élevage de thons en fermes (55% des thons produits) pollue les eaux et les terres avec des produits chimiques et des antibiotiques. Les poissons tombent malades et les maladies peuvent se répandre vite via les oiseaux marins qui les mangent.	4 - La pêche des sardines/maquereaux provient de l'océan Atlantique Nord-Est (Méditerranée, Maroc et Mauritanie) au chalut coulisant et à la senne pélagique, mettant en péril la sécurité alimentaire des communautés locales.	3 - La production de coquillages est un secteur d'emploi important (environ 17 000 personnes), il s'agit d'une main d'oeuvre familiale.	1 - Le développement et la consommation d'algues est recommandé pour la transformation du système alimentaire par les institutions internationales (FAO) et les institutions européennes, et correspond à l'ODD (objectif de développement durable) relatif à une aquaculture durable/faible niveau trophique. C'est une filière en plein essor.	2 - Production locale et porteuse d'emploi.	1 - La production d'huile de colza est une filière porteuse d'emploi. Elle a besoin de soutien pour la production bio.
Condition animale	Impacts sur les conditions de vie des animaux selon la densité dans les cages, les maladies, les pratiques d'élevage et de pêche.	6 - Dans les fermes d'élevage de saumon terrestre, les densités sont de 70 kg à 150 kg de saumons par mètre cube d'eau, ce qui augmente les risques de maladies infectieuses.	5 - Dans les élevages de saumons en cages marines, les densités sont de l'ordre de 25 kg de saumons par mètre cube d'eau. Le bien-être est dégradé à partir du seuil de environ 10-20 kg/m3.	6 - Souffrances des thons capturés, après suffocation et agonie, ils sont congelés vivants dans les cales des navires. 100,000 tonnes d'espèces non ciblées sont capturées et rejetées chaque année dans les pêcheries mondiales de thon.	3 - Stress et souffrances liés à l'agonie des poissons pris au piège dans les filets.	2 - Peu d'impact sur la condition animale.	1 - Pas d'impact sur la condition animale.	1 - Pas d'impact sur la condition animale.	1 - Pas d'impact sur la condition animale.

Annexe B - Le tableau des choix alimentaires (version détaillée)

	Saumon			Autres poissons et coquillages				Végétal			Compléments alimentaires en huile de poisson		Compléments alimentaires végétaux		
	Saumon (élevage terrestre)	Saumon (élevage en mer)	Saumon bio	Truite fumée d'élevage français	Thon albacore en boîte (pêche)	Sardines, maquereaux	Coquillages (moules, huîtres)	Algues	Huile de lin (bio)	Huile de colza (bio)	Simiil saumon fumé	Compléments alimentaires en huile de poisson	Compléments alimentaires végétaux	Compléments alimentaires végétaux	
Santé humaine	Éléments toxiques	1- Contamination aux PCB, PFAS et microplastiques. Principal mode d'imprégnation : les poissons gras et les crustacés	1- Contamination aux PCB, PFAS et microplastiques. Principal mode d'imprégnation : les poissons gras et les crustacés	1- Contamination aux PCB et PFAS possiblement plus élevée que dans le saumon d'élevage non bio en raison de la composition des aliments contaminants plus de petits poissons pélagiques	1- Contamination aux PCB, PFAS et microplastiques	1- Le thon et la sardine présentent le plus fort taux de contamination au mercure	1- Les coquillages comptent parmi les choix alimentaires qui contribuent le plus à l'exposition aux métaux lourds	2- Varie selon la qualité de l'eau	1- L'huile de lin bio ne contient pas d'éléments toxiques (PCB, PFAS, microplastiques)	1- L'huile de colza bio ne contient pas d'éléments toxiques (PCB, PFAS, microplastiques)	1- Le simiil saumon fumé ne contient pas d'éléments toxiques (PCB, PFAS, microplastiques)	1- Contamination aux PCB	1- Un complément alimentaire végétal ne contient pas d'éléments toxiques (PCB, PFAS, microplastiques)	1- Un complément alimentaire végétal ne contient pas d'éléments toxiques (PCB, PFAS, microplastiques)	
	Couverture journalière en oméga 3 en pourcentage pour 100g de produit - Femmes	2- Consommer quotidiennement 100g de saumon fumé couvre 72,6% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA >	2- Consommer quotidiennement 100g de saumon fumé couvre 72,6% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA >	2- Consommer quotidiennement 100g de saumon fumé couvre 72,6% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA >	3- Consommer quotidiennement 100g de truite fumée couvre 30,3% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA >	3- Consommer du thon albacore en boîte couvre 28,5% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA >	1- Consommer quotidiennement 100g de sardines/maquereaux couvre 85% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA >	5- Consommer quotidiennement 100g de coquillages couvre 35,5% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA >	1- Les algues ne fournissent pas oméga 3	1- Consommer quotidiennement 100g d'huile de colza couvre 237% des besoins journaliers en oméga 3. 3 cuillères à café par jour apporte 100% des apports journaliers. Oméga 3 de type ALA >	1- Consommer quotidiennement 100g d'huile de colza couvre 328% des besoins journaliers en oméga 3. 2 à 3 cuillères à soupe par jour apporte 100% des apports journaliers. Oméga 3 de type ALA >	n.a	n.a	n.a	
3	Couverture journalière en oméga 3 en pourcentage pour 100g de produit - Hommes	3- Consommer quotidiennement 100g de saumon fumé couvre 56,6% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA >	3- Consommer quotidiennement 100g de saumon fumé couvre 56,6% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA >	3- Consommer quotidiennement 100g de saumon fumé couvre 56,6% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA >	3- Consommer du thon albacore en boîte couvre 22% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA >	2- Consommer quotidiennement 100g de saumon fumé couvre 71,4% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA >	3- Consommer quotidiennement 100g de coquillages couvre 10,3% des besoins journaliers en oméga 3. Oméga 3 de type DHA et EPA >	n.a	1- Consommer quotidiennement 100g d'huile de colza couvre 291% des besoins journaliers en oméga 3. 3 à 6 cuillères à soupe par jour apporte 100% des apports journaliers. Oméga 3 de type ALA >	1- Consommer quotidiennement 100g d'huile de colza couvre 291% des besoins journaliers en oméga 3. 3 à 6 cuillères à soupe par jour apporte 100% des apports journaliers. Oméga 3 de type ALA >	n.a	n.a	n.a		
	Coût financier pour 31 jours		3- 62€			5- 55,48€			1- 2,65€		3- 17,80€	2- 13,30€			
Environnement	Biodiversité	3- 79,6% Appauvrissement de la couche d'ozone, épuisement des ressources – Fortes pressions environnementales liées à l'alimentation des saumons / Approvisionnement en farines végétales contribue à la déforestation en Amazonie et les farines de poisson aggravent la surpêche et le déclin des populations de poissons sauvages. De nombreux dysfonctionnements sont documentés concernant les équipements de traitement de l'eau engendrant des pollutions de l'air et de l'eau. Un type d'élevage est ultra-énergivore tant en eau qu'en électricité.	3- 79,6% Eutrophication marine, appauvrissement de la couche d'ozone, épuisement des ressources – Pression environnementale liée à l'alimentation / Dégradative force de la qualité de l'eau du milieu marin / rejets de nutriments et déchets, eutrophication et bloom de phytoplancton, rejets de pesticides et microplastiques / Déclin des populations de truites et saumons sauvages du aux évasions de saumons sauvages (prédation, perturbation génétique et propagation des maladies) / Menace des espèces sauvages avoisinant les élevages, en cause : une qualité de l'eau dégradée des politiques de contrôle limit des prédateurs	3- 80% Ecotoxicité pour écosystèmes marins / Appauvrissement de la couche d'ozone	4- 94,8% – Les techniques utilisées par les pêcheurs de thon ont des effets négatifs sur de nombreuses espèces non ciblées (100 000 espèces de captures accessoires et rejets chaque année dans les pêcheries mondiales de thon)	4- 47,8% Acidification terrestre et eau douce, épuisement des ressources énergétiques et eau, écotoxicité pour écosystèmes aquatiques d'eau douce	4- 47,3% Épuisement des ressources énergétiques	4- 54,2% Acidification terrestre et eaux douces, épuisement des ressources minérales	2- 13,4% Utilisation du sol	1- 0%	2- 19,6%	6- Des études suggèrent qu'une disponibilité limitée du krill compromet la reproduction des charies femelles et cause les phoques crabiers à se tourner vers d'autres proies ou à effectuer des voyages de recherche de nourriture plus longs. Source : University of Barcelona (2021) How does the climate crisis affect the Antarctic fur seal? Phys Org. 2 December	n.a	n.a	
	CO2	3- entre 7 et 10kg eqCO2	3- entre 7 et 10kg eqCO2	3- entre 7 et 10kg eqCO2	4- 6,9 eqCO2	3- 4,39 eqCO2	4- 7,26 eqCO2	4- 6,89 eqCO2	2- 3,54 eqCO2	2- 2,28 eqCO2	1- 1,6 eqCO2	4- La pêche au krill affecte le rôle crucial que jouent ces crustacés dans la régulation et le stockage du carbone	n.a	n.a	
Impact sociétal	Droits humains, détournement des ressources alimentaires et gaspillage alimentaire, emploi	3- Fort détournement des productions de soja et de la pêche des petits pélagiques pour nourrir les saumons au détriment des peuples humains / Les captures de la pêche minière mondiale sont composées de plaques directement comestibles par les humains / Fort gaspillage au cours de la chaîne de production (pêche destinée à l'élevage, mort massive de poissons au cours de la pêche et de l'élevage, dans la chaîne de distribution et de consommation) / Déclin des populations de poissons sauvages et déséquilibre des écosystèmes marins / Perte de revenus pour la pêche artisanale qui maintient plus les mêmes seuils de pêche / Augmentation des prix des poissons et du nombre de personnes sous-alimentées (réduction de la disponibilité des poissons migrateurs en Afrique de l'Ouest et donc réduction de l'apport en protéines animales notamment au Sénégal et en Gambie) / Contribution à la pêche illicite non déclarée et non réglementée	3- Augmentation de la part de ingrédients d'origine marine - exigence du cahier des charges en Bio - aggrave les problèmes liés à la pêche de petits pélagiques cibles	4- 1 kg de truite (truite de grande taille) nécessite la biomasse de 1,8 harengs ou 40 anchois / Violation des droits humains : traite des êtres humains, violences physiques et verbales, rétentions des salaires / Transformation et mise en conserve - violences physiques et verbales sur les fermes, sous-paiement	4- Provenance de l'océan Atlantique Nord-Est (Méditerranée, Maroc et Mauritanie) au chalut coulissant et à la senne pélagique	3- Secteur d'emploi important : environ 2 000 personnes. Il s'agit d'une main d'œuvre familiale.	1- Filière en plein essor, le développement de la filière et la consommation d'algues est recommandé pour la transformation du système alimentaire à l'échelle mondiale (Commission EAT Lancet), IUE et pour l'ODD relatif à une aquaculture durable/faible niveau trophique. La France a publié une première feuille de route pour la filière en février 2024.	1- Secteur en pleine expansion +15% de 2009 à 2020. Emploi 6500 personnes	1- Filière portuese d'emploi, à besoin de soutien pour le bio	1- Pas d'impacts	3- Mêmes problèmes liés à la surpêche de petits pélagiques / Déclin des populations de poissons sauvages et déséquilibre des écosystèmes marins / Perte de revenus pour la pêche artisanale qui maintient plus les mêmes seuils de pêche / Augmentation des prix des poissons et du nombre de personnes sous-alimentées (réduction de la disponibilité des poissons migrateurs en Afrique de l'Ouest et donc réduction de l'apport en protéines animales notamment au Sénégal et en Gambie) / Contribution à la pêche illicite non déclarée et non réglementée	1- Pas d'impacts	1- Pas d'impacts	1- Pas d'impacts	
	Densité	3- 70 kg à 150 kg de saumons / m3	3- 25 kg / m3 (moyenne basée sur la taille adulte des saumons). Le bien-être est dégradé à partir du dépassement d'un seuil de 22 Kg/m3 en cages hautes pour les saumons atlantiques	3- 10 kg/m3 à 20kg/m3	3- Moyenne de 80 Kg/m3	3- Non concerné. Le thon consommé est majoritairement issu de la pêche	3- Non concerné. Les poissons "proir" sont issus de la pêche	n.a	1- Pas d'impact sur la condition animale	1- Pas d'impact sur la condition animale	1- Pas d'impact sur la condition animale	1- Pas d'impact sur la condition animale	5- Non concerné. Les poissons pêchés pour être transformés en compléments alimentaires sont issus de la pêche	1- Pas d'impact sur la condition animale	
Condiotion animale	Maladies	4- Les risques de maladies infectieuses s'accroissent avec l'augmentation de la densité (Vahmaradi et al. 2016, Wedemeyer 1998, Commission européenne 2004 citée par Sirakov et Ivancheva 2008, Ellis et al. 2002, Moccia et al. 2021, Turnbull et al. 2008, Escudero 2019) / Risque moindre mais pas exclu d'infection aux poux de mer, virus, bactéries et champignons. / Le taux de renouvellement d'eau étant faible en élevage en RAS, si des pathogènes se développent dans l'eau, ils s'accumulent rapidement dans le système au lieu d'être évacués par le renouvellement de l'eau	4- Forte infestation aux poux de mer naturellement présents en milieu marin / Propagation des virus, bactéries et champignons 2018 / Risques d'ulcères et autres maladies dues à une mauvaise qualité de l'eau	4- Forte infestation aux poux de mer (présente en milieu marin) / Propagation des virus, bactéries et champignons 2018 / Risques d'ulcères et autres maladies dues à une mauvaise qualité de l'eau	4- Les risques de maladies infectieuses s'accroissent avec l'augmentation de la densité (Vahmaradi et al. 2016, Wedemeyer 1998, Commission européenne 2004 citée par Sirakov et Ivancheva 2008, Ellis et al. 2002, Moccia, et al. 2021, Turnbull et al. 2008, Escudero 2019) / Risque moindre mais pas exclu d'infection aux poux de mer, virus, bactéries et champignons. / Le taux de renouvellement d'eau étant faible en élevage en RAS, si des	3- Non concerné. Le thon consommé est majoritairement issu de la pêche	3- Non concerné. Les poissons "proir" sont issus de la pêche	2- Peu d'impacts sur la condition animale	1- Pas d'impact sur la condition animale	1- Pas d'impact sur la condition animale	1- Pas d'impact sur la condition animale	1- Pas d'impact sur la condition animale	5- Non concerné. Les poissons pêchés pour être transformés en compléments alimentaires sont issus de la pêche	1- Pas d'impact sur la condition animale	1- Pas d'impact sur la condition animale
	Pratiques d'élevage et de pêche (techniques de pêche, impacts sur les poissons pêchés et les espèces non ciblées)	5- Densités extrêmes conduisant à du stress et des comportements agressifs / Risques d'incidents techniques conduisant à des bottailles de masse	5- Fortes densités conduisant à du stress et des comportements agressifs / Souffrances et mortalités dues aux pratiques "non médicinales" de traitement contre les poux de mer (incluant poissons nettoyeurs, bains deau très chaude ou très froide ou encore le passage au jet haute pression). Touchent les saumons d'élevage, les poissons nettoyeurs et les poissons sauvages. Pas de normes spécifiques pour la santé, le bien-être ou la mortalité des poissons nettoyeurs. / Stress et mortalités dus aux prédateurs auxquels les saumons d'élevage ne peuvent pas échapper. En Ecosse, 500 000 saumons meurent chaque année directement à cause des prédateurs ou indirectement à cause du stress qui les cause.	5- Le droit français ne dispose pas de normes spécifiques sur le bien-être des poissons pendant la phase d'élevage. / Les densités élevées sont contraires au comportement naturel des truites : en milieu sauvage, lorsqu'elles vivent en liberté, les truites sont solitaires et territoriales pendant l'essentiel de leur vie, et vivent à très faible densité / Souffrances des poissons pêchés dans le cadre de la pêche minière pour l'alimentation des truites	5- Le droit français ne dispose pas de normes spécifiques sur le bien-être des poissons pendant la phase d'élevage. / Les densités élevées sont contraires au comportement naturel des truites : en milieu sauvage, lorsqu'elles vivent en liberté, les truites sont solitaires et territoriales pendant l'essentiel de leur vie, et vivent à très faible densité / Souffrances des poissons pêchés dans le cadre de la pêche minière pour l'alimentation des truites	3- Stress et souffrances liés à l'agonie des poissons pris au piège dans les filets	3- Stress et souffrances liés à l'agonie des poissons pris au piège dans les filets	2- Peu d'impacts sur la condition animale	1- Pas d'impact sur la condition animale.	1- Pas d'impact sur la condition animale.	1- Pas d'impact sur la condition animale.	1- Pas d'impact sur la condition animale.	5- Compétition entre les navires de pêche et les espèces prédatrices du krill - la pêche ciblée au krill, concentrée dans des zones spécifiques et déjà sous pression entraîne une compétition entre les navires de pêche et des espèces clés comme les manchots, les baleines et les phoques dans leurs zones de recherche de nourriture. / Plusieurs tonnes métriques de captures accessoires (autres que le krill, compris des mammifères marins) par an et par navire de pêche. En 2021, trois jeunes baleines à bosse se sont prises dans un filet utilisé par Aker BioMarine en mer Antarctique en l'espace de deux mois.	1- Pas d'impact sur la condition animale.	1- Pas d'impact sur la condition animale.