

3.1 On considère trois modèles de régression emboîtés afin de modéliser le nombre d'accidents de voiture selon la région (region). La variable catégorielle niveaux de risque (risque) a 3 niveaux et le nombre d'années d'expérience (expe) au volant est un facteur à 4 niveaux.

| Modèle | variables | $p + 1$ | $\ell(\hat{\beta})$ | AIC | BIC |
|----------------|------------------------|---------|---------------------|---------|---------|
| M ₁ | risque | 3 | -244.566 | 495.132 | 510.362 |
| M ₂ | risque + region | * | -151.620 | * | * |
| M ₃ | risque + region + expe | 10 | -139.734 | 299.468 | 350.235 |

Table 1: Mesures d'adéquation de trois modèles emboîtés avec les covariables, le nombre de coefficients du modèle ($p+1$), la valeur de la log-vraisemblance évaluée au maximum de vraisemblance ($\ell(\hat{\beta})$) et les critères d'information.

Quelle est la différence entre le AIC et le BIC du modèle M₂ (en valeur absolue)?

3.2 Une variable aléatoire X suit une loi géométrique de paramètre p si sa fonction de masse est

$$P(X = x) = (1 - p)^{x-1} p, \quad x = 1, 2, \dots$$

- Écrivez la vraisemblance et la log-vraisemblance d'un échantillon aléatoire de taille n si les observations sont indépendantes.
- Dérivez l'estimateur du maximum de vraisemblance pour le paramètre p .
- Calculez l'information observée.
- Supposons qu'on a un échantillon de 15 observations, $\{5, 6, 3, 7, 1, 2, 11, 8, 7, 34, 1, 7, 10, 1, 0\}$, dont la somme est 103. Calculez l'estimé du maximum de vraisemblance et son erreur-type approximative.
- Calculez la statistique du rapport de vraisemblance et la statistique de Wald pour un test à niveau 5% de l'hypothèse $\mathcal{H}_0: p_0 = 0.1$ contre l'alternative bilatérale $\mathcal{H}_a: p_0 \neq 0.1$.

On considère un modèle pour le nombre de ventes quotidiennes dans un magasin, supposées indépendantes. Votre gestionnaire vous indique que ce dernier fluctue selon qu'il y ait des soldes ou pas. Vous spécifiez un modèle de Poisson avec fonction de masse

$$P(Y_i = y_i | \text{soldes}_i) = \frac{\exp(-\lambda_i) \lambda_i^{y_i}}{y_i!}, \quad y_i = 0, 1, \dots$$

et on modélise $\lambda_i = \exp(\beta_0 + \beta_1 \text{solde}_i)$, où solde_i est un indicateur binaire qui vaut un lors des soldes et zéro autrement.

- Dérivez l'estimateur du maximum de vraisemblance pour (β_0, β_1) . *Indice: les estimateurs du maximum de vraisemblance sont invariants aux reparamétrisations. Considérez les deux échantillons solde/hors solde.*
- Calculez les estimés si on a un échantillon du nombre de ventes pour 12 jours indépendants, soit $\{2; 5; 9; 3; 6; 7; 11\}$ hors soldes, et $\{12; 9; 10; 9; 7\}$ pendant les soldes.
- Calculez la matrice d'information observée et utilisez-la pour dériver les erreurs-type de $\hat{\beta}_0$ et de $\hat{\beta}_1$ et un intervalle de confiance à niveau 95%.
- Votre gérant veut savoir si les profits quotidiens moyens pendant les soldes sont différents des jours ordinaires, sachant que le profit moyen pour les jours hors solde est de 25\$ par transaction, mais seulement 20\$ pendant les soldes. Faites un test de rapport de vraisemblance (profilée) pour estimer cette hypothèse. *Indice: écrivez l'hypothèse nulle en fonction des paramètres du modèles β_0 et β_1 (difficile).*